

DFP Literaturstudium

Kleines 1x1 der Hypophysenmedizin – Teil 2

Differentialdiagnose der Hyperprolaktinämie und OP Indikationen bei Hypophysentumoren

Wie häufig sind Hypophysentumoren klinisch relevant (klinisch apparent)?

- ☐ A) 5–10 pro 100 Personen
- ☐ B) 0,5–1 pro 1.000 Personen
- ☐ C) 50–100 pro 1.000 Personen
- ☐ D) 1 pro 10.000 Personen

Ab welcher Größe spricht man definitionsgemäß von einem Makroadenom?

- ☐ A) > 5 mm
- ☐ B) $\geq$ 8 mm
- ☐ C) > 10 mm
- ☐ D) > 20 mm

Was ist der einfachste Test, um einen Hypercortisolismus (M. Cushing) zu diagnostizieren?

- ☐ A) ACTH-Stimulationstest
- ☐ B) 1-mg-Dexamethasonhemmttest
- ☐ C) Wasserentzugstest
- ☐ D) Insulin-Hypoglykämietest

Wie wird der 1-mg-Dexamethasonhemmttest praktisch durchgeführt?

- ☐ A) 1 mg Dexamethason um 23:00 Uhr, Cortisol-Bestimmung am nächsten Tag um 8:00 Uhr morgens nüchtern
- ☐ B) 1 mg Dexamethason um 8:00 Uhr, Cortisol-Bestimmung am gleichen Tag um 23:00 Uhr

- ☐ C) 2 mg Dexamethason um 23:00 Uhr, Cortisol-Bestimmung nach 48 Stunden
- ☐ D) 0,5 mg Dexamethason um 18:00 Uhr, Cortisol-Bestimmung nach 2 Stunden

Welcher Cortisol-Wert nach 1-mg-Dexamethasonhemmttest spricht gegen ein Cushing-Syndrom?

- ☐ A) $< 10 \mu\text{g/dl}$
- ☐ B) $< 4,5 \mu\text{g/dl}$
- ☐ C) $< 1,8 \mu\text{g/dl}$
- ☐ D) $> 20 \mu\text{g/dl}$